

**Stato delle revisioni**

Indice rev.	Data	Par. n°	Pag. n°	Sintesi della modifica	Redazione
07	03/03/22		1,2	Aggiornamento modalità di consegna dei campioni e raccolta feci per ricerca parassiti	C. Giacomazzi N. Jordaney
06	14/02/22		1,2	Aggiornamento modalità di consegna dei contenitori/campioni	B. Bernardi, C. Giacomazzi, N. Jordaney
05	11/10/21		2	Aggiornamento modalità raccolta feci	N. Jordaney
04	03/12/20			Aggiornamento modalità di consegna dei contenitori/campioni	N. Jordaney
03	24/02/20		1	Eliminazione descrizione raccolta feci per calprotectina (vedi DOC11)	N. Jordaney
02	04/07/18		1,2	Aggiornamento modalità di prelievo	N. Jordaney
01	22/01/18		1	Aggiornamento raccolta feci	N. Jordaney
0	15/03/17			Prima emissione	N. Jordaney

Escreato:

Nota: si ricorda che la saliva non è ritenuta idonea per l'esame colturale e che è sempre raccomandato programmare la raccolta del campione prima di iniziare la terapia antibiotica.

- RACCOLTA DELL'ESCREATO PER COLTURA E MICROSCOPIA

Prima della raccolta leggere attentamente le istruzioni d'uso del contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.

Al risveglio togliere eventuali protesi, eseguire **gargarismi** con sola acqua (almeno 2 volte) per ridurre la contaminazione dei campioni di escreato con le secrezioni delle alte vie aeree.

Raccogliere l'escreato nell'apposito contenitore.

Consegnare il contenitore presso il Centro Prelievi Unificato o i Poliambulatori dei vari distretti territoriali il giorno della raccolta dalle ore 8.30 alle 10.00.

Nota: nel caso di ricerca dei BACILLI ALCOOL - ACIDO RESISTENTI i campioni, da raccogliere per 3 giorni consecutivi, devono essere conservati in frigorifero a 4°C fino al completamento della serie, quindi essere consegnati al Centro Prelievi Unificato o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali dalle ore 8.30 alle 10.00.

Feci:

- RACCOLTA FECI PER ESAME CHIMICO FISICO

Non occorre seguire una dieta particolare nei giorni precedenti l'esame.

Raccogliere con la spatolina annessa al contenitore fornito dal Centro Prelievi Unificato, dalle farmacie o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali una piccola quantità di materiale fecale precedentemente emesso in un contenitore pulito. Consegnarlo presso il Centro Prelievi Unificato o i Poliambulatori dei vari distretti territoriali il giorno della raccolta dalle ore 8.30 alle 10.00.

- RACCOLTA FECI PER COLTURA

Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un piccolo quantitativo di feci (circa 1/3 del contenitore) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, prelevando anche eventuali porzioni mucose e/o ematiche.

Consegnarlo presso il Centro Prelievi Unificato o i Poliambulatori dei vari distretti territoriali il giorno della raccolta dalle ore 8.30 alle 10.00.

- RACCOLTA FECI PER RICERCA PARASSITI

Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche. Evitare l'uso di lassativi oleosi nei giorni precedenti.

Campione delle prime feci del mattino o delle ultime della sera precedente. Per un corretto risultato è opportuno eseguire l'esame parassitologico su almeno 3 campioni di feci raccolti in giorni diversi (preferibilmente a giorni alterni).

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un piccolo quantitativo di feci (circa 1/3 del contenitore) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, prelevando anche eventuali porzioni mucose e/o ematiche.

Consegnare il contenitore al Centro Prelievi Unificato o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali il giorno della raccolta oppure il giorno successivo, previa conservazione del campione di feci in frigorifero, dalle ore 8.30 alle 10.00.

File	DOC 10 - Raccolta campioni biologici Rev 07	Redazione	C. Giacomazzi, N. Jordaney
Data applicazione	03/03/22	Verifica	N. Jordaney
Copia	Controllata	Approvazione	Direttore S.C. M. Di Benedetto



• RACCOLTA FECI PER RICERCA VIRUS

Campione delle prime feci del mattino.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un piccolo quantitativo di feci (circa 1/3 del contenitore) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.

Consegnare il contenitore presso *il Centro Prelievi Unificato* dalle ore 8.30 alle 10.00 entro 1 ora dalla raccolta.

• RACCOLTA FECI PER RICERCA ANTIGENI HELICOBACTER PYLORI

Nelle 2 settimane precedenti l'esame non si devono assumere inibitori della pompa protonica, antiacidi e preparazioni a base di sali di bismuto.

Campione delle prime feci del mattino o delle ultime della sera precedente.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un quantitativo di feci emesse spontaneamente (0,5-2 grammi circa di feci, corrispondenti al volume di una noce) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.

Consegnare il contenitore al Centro Prelievi Unificato o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali il giorno della raccolta oppure il giorno successivo, previa conservazione del campione di feci in frigorifero per un massimo di 12 ore, dalle ore 8.30 alle 10.00.

• RACCOLTA FECI PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO

Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche. Non occorre seguire una dieta particolare prima del test.

Non eseguire il test durante il periodo mestruale né mentre si è affetti da emorroidi o sanguinamenti gengivali.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: esempio: piatto di carta/plastica). Evitare di contaminare le feci con le urine.

Svitare ed estrarre il tappo dell'apposito contenitore fornito dal Centro Prelievi Unificato, dalle farmacie o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale ed in verticale, reinserire l'asticella nel contenitore, riavvitare ed agitare. Conservare in frigorifero e consegnare al Centro Prelievi Unificato o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali entro 7 giorni.

Prelievo oro-faringeo (TAMPONE FARINGEO GERMI COMUNI COLT., TAMPONE FARINGEO STREPTO BETA-EMOLITICI COLT., TAMPONE TONSILLARE)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato.

E' necessario che il paziente arrivi a digiuno e non si sia lavato i denti prima del prelievo.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antibiotica.

Prelievo per ricerca germi comuni tramite tampone (CUTE COLT., AURICOLARE COLT., OCULARE COLT., GLANDE COLT.)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato.

Non applicare creme o lozioni o colliri né lavare la zona interessata nelle 24 ore prima del prelievo.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antibiotica e/o antimicotica.

Ricerca dermatofiti da cute (CUTE ESAME MICROSCOPICO PER MICETI, CUTE MICETI DERMATOFITI COLT.)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato.

Non applicare creme o lozioni o colliri né lavare la zona interessata nelle 24 ore prima del prelievo.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antibiotica.

Ricerca dermatofiti da unghie (UNGHIA MANO ESAME MICROSCOPICO PER MICETI, UNGHIA MANO MICETI DERMATOFITI COLT., UNGHIA PIEDE ESAME MICROSCOPICO PER MICETI, UNGHIA PIEDE MICETI DERMATOFITI COLT.)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato.

Evitare di tagliare le unghie per almeno 7 giorni prima del prelievo.

Non applicare lozioni nelle 24 ore prima del prelievo; il paziente può lavarsi normalmente.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antimicotica.

Scotch Test (ricerca ossiuri)

Evitare l'uso di lassativi oleosi nei giorni precedenti.

Per organizzare la raccolta, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato.

La raccolta deve essere eseguita al mattino prima di lavarsi e prima di aver defecato.

Per un corretto risultato è opportuno eseguire l'esame parassitologico su almeno 3 raccolte di giorni alterni.

Liquido seminale:

La raccolta deve essere eseguita almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche e con astinenza dai rapporti sessuali, per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore ai 5.

Lavarsi le mani con acqua e sapone.

Lavarsi i genitali esterni con acqua e sapone non medicato, sciacquare accuratamente e asciugare con un fazzoletto di carta. Urinare. Procedere alla raccolta dello sperma (non è possibile raccoglierlo con il profilattico) nell'apposito contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato.

Nota: Il contenitore deve essere consegnato al Centro Prelievi Unificato dalle ore 8.30 alle 10.00.

Secreto uretrale (uomo)

Per organizzare la raccolta, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato.

La raccolta deve essere eseguita almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche, al mattino e senza aver urinato per almeno 5 ore.

Lavarsi i genitali esterni con acqua e sapone non medicato, sciacquare accuratamente e asciugare con un fazzoletto di carta.