



## TC con MEZZO di CONTRASTO

Nome.....

Cognome.....

Età.....

### CLASSE DI RISCHIO di INSORGENZA CIN

- 1° CLASSE (eGFR >60 senza fattori di rischio)
- 2° CLASSE (eGFR >60 con 1 o piu' fattori di rischio / 30< eGFR <60)
- 3° CLASSE (eGFR <30)

**Fattori di rischio:** trapianto d'organo, diabete mellito, disidratazione-shock-ipotensione, picco monoclonale con BJ positiva, insufficienza cardiaca, recente assunzione di farmaci nefrotossici, eta' >75 aa, recente infusione di mdc (nelle ultime 2 settimane), esame in urgenza.

### AZIONI intraprese per la 2° CLASSE DI RISCHIO:

- Adeguamento della terapia farmacologica (sospensione diuretici; evitare farmaci potenzialmente nefrotossici)
- Sospensione Metformina (se eGFR >60 sospendere la mattina dell'esame, se eGFR <60 sospendere 48h prima)
- Profilassi: idratazione per os (circa 2 l) nei 2 gg precedenti secondo parere medico; assunzione per os il giorno precedente, il giorno dell'esame ed il giorno seguente di Bicarbonato di Na 1 cpr x 3 e Flumucil 600 mg ogni 12 h.
- Follow-up: controllo della creatinina a 48/72 ore, se eGFR <45.

### CLASSE DI RISCHIO ALLERGOLOGICA

- PUNTEGGIO 1: nessuna premedicazione
- PUNTEGGIO 2: premedicazione a carico del prescrittore o dell'allergologo in caso di anamnesi rossa, secondo protocollo.
- PUNTEGGIO 3: premedicazione prescritta da allergologo
- PUNTEGGIO 4: premedicazione prescritta dall'allergologo con presenza del rianimatore.

### PRECEDENTI REAZIONI CUTANEE TARDIVE MCD IODATO

SI

NO

### REAZIONI AVVERSE MOLTO TARDIVE CON MDC IODATI - TIREOTOSSICOSI

SI

NO

DATA

FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO PRESCRITTORE

.....

.....